

効能・効果追加のご案内

血漿分画製剤(液状・静注用免疫グロブリン製剤)

献血 **ヴェノグロブリン[®] IH 5%** 0.5g/10mL・1g/20mL・2.5g/50mL
静注 5g/100mL・10g/200mL

生物学的製剤基準 ポリエチレングリコール処理免疫グロブリン

2013年8月

一般社団法人
〔製造販売元〕 **日本血液製剤機構**
〔販 売〕 **田辺三菱製薬株式会社**

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、ポリエチレングリコール処理免疫グロブリン「献血ヴェノグロブリンIH5%静注」につきまして、下記の通り、天疱瘡に関する効能・効果の追加が承認されましたのでご案内申し上げます。

今後とも、一層のご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

承認内容

●【効能・効果】、【用法・用量】の追加

効能・効果	天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な場合）
用法・用量	通常、1日に免疫グロブリンGとして400mg（8mL）/kg体重を5日間連日点滴静注する。 なお、年齢及び症状に応じて適宜減量する。

* 禁忌を含む使用上の注意等につきましては、最新の添付文書をご参照ください。

お問い合わせ先

一般社団法人 日本血液製剤機構 くすり相談室
〒105-6107 東京都港区浜松町2-4-1 電話0120-853-560（日本血液製剤機構営業日の9:00～17:30）